

Nachsorgeempfehlung: Kolonkarzinom UICC-Stadium I

| Untersuchung | Monate | | | | | | |
|---|----------------|----|----|----|----|----|----|
| | 6 | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | 60 |
| Anamnese, körperliche Untersuchung, CEA | X ³ | | | X | | | X |
| Koloskopie | X ³ | | | X | | | X |

Nachsorgeempfehlung: Kolonkarzinom UICC-Stadium II-III

| Untersuchung | Monate | | | | | | |
|---|----------------|----|----|----|----------------|----|----|
| | 6 | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | 60 |
| Anamnese, körperliche Untersuchung, CEA | X | X | X | X | X | X | X |
| Sonographie: Abdomen | X | X | X | X | X | X | X |
| Röntgen: Thorax ⁴ | | X | | X | X | X | X |
| Koloskopie | X ¹ | | | | X ² | | |

- ¹ Wenn präoperativ eine vollständige Koloskopie nicht möglich war.
- ² Bei unauffälligem Befund (kein Adenom, kein Karzinom) nächste Koloskopie nach fünf Jahren.
- ³ Nach endoskopischer Abtragung.
- ⁴ Empfehlung entspricht der alten DGVS-Leitlinie von 1999.

Spiral-Computertomographie Abdomen: befundorientiert (z.B. bei unklarem Sonographiebefund, CEA-Anstieg).